


Livistona benthamii

F.M.Bailey

La livistona de Bentham es originaria de Papua Nueva Guinea, Indonesia y Queensland, en Australia, y le gusta crecer en los bosques pantanosos. Perteneció a la familia Arecáceas. El nombre de este género se puso en honor a Patrick Murray, barón de Livingston, que con su colección de plantas ayudó a fundar el Jardín Botánico de Edimburgo en 1670. La especie se nombró en honor de George Bentham, botánico Inglés del siglo XIX.

Planta de tronco único y recto de hasta 20 m de alto y unos 20 cm de diámetro. Sus hojas palmadas forman una densa corona porque las hojas viejas se mantienen durante mucho tiempo en la planta; miden aproximadamente medio metro y tienen un largo peciolo de casi 2 m armado con grandes espinas; son de color verde oscuro brillante, con el envés más claro. El limbo está muy dividido, con numerosos foliolos colgantes. Es una



especie dioica, con los sexos separados en distintas plantas. Las flores son de un tono blanquecino o amarillo pálido, de forma tubular, y se presentan solitarias o en pequeños racimos. Las inflorescencias no son ramificadas y no superan el límite de la corona. El fruto es entre globoso y ovoide, de color púrpura negruzco.

Es una palmera de crecimiento rápido, su situación ideal es en semisombra. De joven resulta muy adecuada como planta de interior.

English: Fan palm, Cabbage palm.